

**PLAQUETTE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES INJECTIONS
DE PRODUIT DE CONTRASTE IODE**
(scanner, urographie intraveineuse, contrôle de cathéter)

NOM :

Prénom :

n° :

Demande de renseignements à remettre obligatoirement à tout patient devant recevoir une injection de produit de contraste iodé (en particulier scanner), à joindre à la demande d'examen, puis à laisser dans le dossier radiologique

Madame, Monsieur,

Il pourra être nécessaire de vous injecter dans une veine un produit de contraste iodé. Des informations concernant cette injection vous sont fournies au verso de cette feuille. Avant de réaliser l'injection, nous avons besoin des renseignements suivants :

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1. Avez-vous déjà eu de l'asthme, de l'eczéma, de l'urticaire, un rhume des foies, un œdème de Quincke, un problème d'allergie, une réaction avec des médicaments ou un produit contenant de l'iode ? | non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> |
| 2. Avez-vous déjà eu un scanner ou un autre examen radiologique avec injection de produit de contraste (iode) : urographie intraveineuse ? | non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> |
| Si oui, avez-vous bien supporté l'injection de produit ? | oui <input type="checkbox"/> | non <input type="checkbox"/> |
| Si non, qu'avez-vous ressenti ? | | |
| 3. Vous a-t-on prescrit un traitement en prévision du scanner prévu ? | non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> |
| Si oui, lequel ? | | |
| 4. Prenez-vous un traitement pour le diabète ? | non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> |
| Si oui, lequel ? | | |
| 5. Prenez-vous un traitement pour l'hypertension ou pour le cœur ? | non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> |
| Si oui, lequel ? | | |
| 6. Avez-vous une insuffisance rénale ? | non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> |
| 7. Avez-vous une maladie de la thyroïde ? | non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> |
| 8. Pour les femmes en âge d'avoir des enfants, êtes-vous susceptible d'être enceinte au moment de l'examen ? | non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> |

Date :

Signature du patient :



**INFORMATIONS CONCERNANT LES INJECTIONS DE PRODUIT DE CONTRASTE IODE
(SCANNER, UROGRAPHIE INTRAVEINEUSE, CONTROLE DE CATHETER)**

Il peut être nécessaire de vous injecter dans une veine un produit de contraste iodé au cours de l'examen qui vous a été prescrit.

Vous restez bien sûr libre de refuser cette injection, mais il y a alors des risques à ne pas faire cette exploration qui a été jugée nécessaire pour mieux vous traiter parce que l'injection d'iode améliore l'interprétation des images.

Quel produit utilise-t-on ?

Un produit à base d'iode, opaque aux rayons x. Le type de produit, ses modalités d'administration seront adaptés à votre cas par le médecin radiologue.

Que ressentirez-vous ?

Cet examen n'est pas douloureux. Une légère sensation de chaleur au moment de l'injection intraveineuse (dans tout le corps, dans la gorge ou le bas du ventre) ou encore la sensation d'un goût bizarre dans la bouche sont fréquentes et normales.

Y a-t-il un risque au point d'injection ?

Sous l'effet de la pression, il peut se produire une déchirure de la veine et une fuite du produit de contraste sous la peau. Cette complication est rare (un cas sur plusieurs centaines d'injections), généralement sans suites graves, mais peut nécessiter un traitement local. Si vous ressentez une douleur au point d'injection, signalez-le immédiatement.

Y a-t-il un risque pour l'organisme lors de l'injection ?

L'injection est un acte très courant, habituellement très bien toléré.

Cependant, comme avec d'autres médicaments, des réactions peuvent survenir :

- de petits désagréments très passagers, comme des nausées pendant quelques secondes (d'où la nécessité de ne pas manger dans les trois heures qui précèdent l'examen), ou des démangeaisons, sont banals ; le fait de ne pas manger trois heures avant l'examen ne vous empêche pas de prendre vos médicaments avec un peu d'eau ;

- plus rarement, une réaction allergique peut nécessiter un traitement ;

- très exceptionnellement et comme pour toute injection de médicament, un traitement plus intensif, voire une hospitalisation, seront nécessaires. Les complications réellement graves (risque vital) sont rarissimes et surviennent dans l'immense majorité des cas au cours ou dans la demi-heure suivant l'injection. Pour cette raison, vous serez par prudence gardé(e) en surveillance après l'examen pendant environ 30 minutes dans la salle d'attente.

Des précautions particulières seront prises en fonction des informations que vous aurez données avant l'examen. Si certaines questions restent en suspens, l'équipe médicale est là pour vous répondre.

Avenue de Bourgogne - 54515 VANDOEUVRE-LES-NANCY CEDEX